

Mospilan 20 SP Sumin na ćmę bukszpanową, mszyce, opuchlaki, larwy i chrząszcze 10g



Cena: 18,98 zł

Opis słownikowy

Okazja specjalna Promocja

Producent Sumin

Opis produktu

Mospilan 20 SP Sumin na ćmę bukszpanową, mszyce, opuchlaki, larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej 10 g

Mospilan 20 SP Sumin to środek owadobójczy w formie proszku rozpuszczalnego w wodzie, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących. Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie. Środek Mospilan 20 SP w postaci proszku przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Główne cechy:

- do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych

- środek ma działanie systemiczne/ układowe
- środek wygodny do stosowania, w postaci proszku
- ma szerokie spektrum działania

Stosowanie:

Należy rozpuścić go w wodzie i stosować w formie oprysków. Nie tylko na rośliny ozdobne, drzewa i krzewy owocowe, ale też na bukszpan oraz warzywa. Przeciwdziała szkodnikom takim jak:

- mączlik szklarniowy,
- wciorniatek tytanowiec,
- ciorniatek zachodni,
- miniarki,
- mszyce,
- zmieniki,
- czerwce
- stonka
- owocówka
- opuchlaki
- ćma bukszpanowa

Opryski środkami chemicznymi przeprowadzamy bardzo późnym wieczorem, można to robić po deszczu, ale nie w czasie deszczu i przy dużym wietrze. Należy stosować środki bezpieczeństwa, jak maseczka, rękawiczki.

Drzewa i krzewy kwitnące przyskamy po przekwitnięciu.

Dawkowanie oraz termin stosowania:

- ziemniak - 0,8 g/ 100 m²/ 2-4 l wody
- jabłoń - 1,25-2 g/ 100 m²/ 5-9 l wody
- wiśnia, czereśnia, grusza, śliwa - 1,25-2 g/ 100 m²/ 2-9 l wody
- truskawka - 2-3 g/ 100 m²/ 2-9 l wody
- morela, brzoskwinia, winorośl, borówka wysoka, leszczyna, orzech włoski - 2 g/ 100 m²/ 2-7,5 l wody
- rośliny ozdobne w gruncie i pod osłonami - 0,04 % (4 g/10 l wody/ 3-20 l cieczy roboczej/ 100 m²)

Prewencja: nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin. Zaleca się stosować środek poza okresami aktywności pszczoł oraz innych owadów zapylających.

Zawartość substancji czynnej: acetamipryd - związek z grupy pochodnych neonikotynoidów - 20%.

Zaleca się stosować środek poza okresami aktywności pszczoł oraz innych owadów zapylających.



Uwagi:

UWAGA! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informację zamieszczoną w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków ostrożności zamieszczonych w etykiecie.

W przypadku produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. 2018 poz. 1310 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz. U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć zamówienie oraz być umową sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. 2018 poz. 1310 ze zm.).

Galeria

