

Środek owadobójczy Substral Polysect szeroki zakres owadów 400 ml



Cena: 23,41 zł

Opis słownikowy

Okazja specjalna	Promocja
Producent	Substral

Opis produktu

Środek owadobójczy Substral Polysect szeroki zakres owadów 400 ml

Polysect jest środkiem owadobójczym w formie gotowego do użycia sprayu, o działaniu kontaktowym i żołądkowym przeznaczonym do zwalczania mszyc i innych owadów ssących w amatorskiej uprawie roślin ozdobnych w mieszkaniach oraz roślin ozdobnych uprawianych w ogrodach przydomowych i na działkach rekreacyjnych na terenie otwartym (w gruncie) lub pod osłonami (szklarnie, tunele i roszadniki przydomowe) i niektórych roślin warzywnych uprawianych pod osłonami.

Środek zwalcza mączlika, mszyce oraz wiele innych szkodliwych owadów ssących takich jak miszeczniki, wełnowce, ponadto znacząco ogranicza występowanie wciornastków.

Środek działa szybko - rezultaty widoczne są w 24 godziny.

Preparat długodziałający Substral Polysect do roślin i krzewów ogrodowych jest środkiem działającym systemicznie - czyli wnika w głąb rośliny i krąży wraz z jej sokami, zabezpieczając tym samym roślinę od wewnątrz. Opady deszczu, zmywanie środka z powierzchni roślin oraz wpływ promieniowania słonecznego nie mają istotnego znaczenia w przypadku środka charakteryzującego się działaniem systemicznym. Skutkuje to dłuższą ochroną przed szkodnikami niż w przypadku opryskiwania środkami o innym sposobie działania.

Preparat działa aż do 3 tygodni. Dodatkowo zapewnia działanie prewencyjne - działając nie tylko walczy z owadami, które zaczęły niszczyć roślinę, ale również chroni ją przed atakiem nowych.

Cechy produktu

- pierwsze efekty widoczne w 24 godziny
- długo działający
- gotowy do użycia
- na szeroki zakres szkodników
- do stosowania w domu i ogrodzie
- działa prewencyjnie

Stosowanie:

1. Wstrząsnąć przed użyciem
2. Roślinę opryskiwać tak, aby cieczą użytkową dokładnie pokryć górną i dolną część liści unikając spływania kropel.
3. Należy się upewnić, że zarówno dolna jak i górna część liści została zmoczona

Rośliny ozdobne, domowe rośliny ozdobne, kwitnące rośliny ozdobne i krzewy ozdobne w ogrodach przydomowych i na działkach rekreacyjnych (uprawa w gruncie i pod osłonami):

- maksymalna liczba zabiegów w roku - 2. Odstęp między zabiegami: co najmniej 14-21 dni.

Rośliny jadalne: maksymalna liczba zabiegów w roku - 2. Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.

- Opryskiwać po pojawieniu się pierwszych oznak obecności szkodników. Jeśli to konieczne można zabieg powtórzyć po 14 dniach od pierwszego opryskiwania dla roślin ozdobnych oraz po 10 dniach dla roślin warzywnych.

Na zewnątrz stosować:

- od kwietnia do końca września.

Wewnątrz pomieszczeń można stosować cały rok.

Skład produktu

- Zawartość substancji czynnej: acetamipryd (insektycyd z grupy neonikotynoidów) - 5 g/l (0,5%).

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.



Uwagi:

Nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu podczas stosowania środka. Unikać zanieczyszczenia oczu.

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczenia wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie. Produktów biobójczych należy używać, z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

Galeria

